

Гиполипидемическая терапия

- Основные препараты – статины, которые снижают холестерин и другие липиды и развитие вторичного инсульта до 31%.
- Целевой уровень **ХС-ЛПНП < 1,8 ммоль/л** или снижение его на 50% от исходного уровня.
- Статины необходимо назначать как можно раньше в дозе **80 мг/сут** аторвастатина под контролем уровня трансаминаз, не рекомендуется снижать дозу ниже **40 мг/сут**.

Хирургическая профилактика инсульта

Необходимо проводить **ультразвуковое исследование сонных артерий** для выявления окклюзирующих атеросклеротических поражений у всех пациентов, перенесших **ишемический инсульт и транзиторную ишемическую атаку** для выявления атеросклеротического сужения.

Консультация ангиохирурга с целью определения дальнейшей тактики ведения. Проведение каротидной эндартерэктомии-ликвидация сужения сонных артерий, в наиболее оптимальные сроки **от 2 до 4 недель** от начала проявлений **ТИА (транзиторной ишемической атаки)** или **малого инсульта**.

Профилактика повторного инсульта проводится пациентом пожизненно!



Министерство здравоохранения Республики Бурятия
Республиканский центр медицинской профилактики имени В. Р. Бояновой



Как предупредить ПОВТОРНЫЙ ИНСУЛЬТ



Ваше здоровье в Ваших руках!